

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ VASAMINO +

Призначення: Комплексний препарат для забезпечення рослин доступним живленням, захисту від широкого спектра хвороб та екологічного контролю шкідників. Стимулює активний розвиток вегетативної маси та плодоношення.

Склад: Містить 5 штамів *Bacillus subtilis* ($5 \cdot 10^9$ КУО/мл), спори *Beauveria bassiana* ($2 \cdot 10^8$ КУО/мл), вільні амінокислоти, макро- та мікроелементи, вітаміни.

1. Особливості дії та застосування

- **Захисний бар'єр:** Гриби *Beauveria* діють проти шкідників, а бактерії *Bacillus* створюють захисний екран від патогенів.
- **Швидкий ефект:** Амінокислоти миттєво включаються в метаболізм рослини, знімаючи стреси та прискорюючи ріст.
- **Ефективність:** Найкращий результат спостерігається при обробці в період активного наростання зеленої маси.

2. Способи Застосування та Дозування

Метод Застосування	Доза	Мета / Час Внесення
Обприскування по листу	2.5–3.0 л/га	Захист від інфекцій та шкідників протягом сезону.
Фертигація (крапля)	5.0–6.0 л/га	Живлення та контроль ґрунтових шкідників.
Ручне обприскування	100 мл на 10 л води	Для садів, ягідників та овочевих грядок.

3. Рекомендації Щодо Періодичності

- **Інтервал:** Між обробками має пройти не менше ніж **10–12 днів**.
- **Технологія:** Для обприскування використовувати достатню кількість води для повного змочування всієї надземної частини рослини.

4. Застереження та Зберігання

- **Обмеження:** Не допускати змішування в бакових сумішах із **гербіцидами, фунгіцидами та фумігантами**, оскільки це призведе до загибелі корисних мікроорганізмів.
- **Зберігання:** Температура до **+25 °C**. Уникати перегріву препарату.
- **Використання:** Бажано використати весь об'єм продукту після розгерметизації тари.